

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

01.11.2023.

EE  
L

# Synulox RTU

injekcinē suspensija/suspensija injekcijām/  
sūstesuspensioon

1 ml suspensijos yra:  
amoksicilino 140 mg,  
klavulano rūgštis 35 mg.  
Galvijai, kiaulės, šunys ir katės.  
Priēš naudojimą būtina perskaityti pakuočės lapelį.  
**Išlauka:** galvijienai ir subproduktams – 42 paros,  
pienui – 60 val. (5 melžimai, jei melžiamai 2 kartus per parą);  
kiaulienai ir subproduktams – 31 para.  
Pradūrus kamšteli, sunaudoti per 28 d.  
Laikyti žemesneje kaip 25 °C temperatūroje.

1 ml suspensijas satur:  
Amoksicilins 140 mg  
Klavulaanškabė 35 mg  
Liellopi, cukas, suni un kakki.  
Suniem un kakliem intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.  
Liellopiem un cūkām intramuskulārai lietošanai.  
**Ierobežojumu periods:**  
Liellopiem: Galajai un blakusproduktiem: 42 dienas.  
Pienam: 60 stundas (5 slaukšanas reizes, ja govs tiek slaukta divas reizes dienā).  
Cūkām: Galajai un blakusproduktiem: 31 diena.  
Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.  
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.  
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.  
Lietošanai dzīvniekiem.  
Uzglabāt bēniem neredzamā un nepieejamā vietā.  
V/NRP/02/1476

100 ml

1 ml sūstesuspensiooni sisaldab:  
Amoksitsillin 140 mg  
Klavulaanhape 35 mg  
Veis, siga, koer, kass.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**Keeluage:**  
Veis: lihale ja soödavatele kudedele: 42 päeva;  
piimale: 60 tundi. Kui lehmi lüpstatke kaks korda päevas, võib hakata  
piima inimtoiduks koguma siis, kui ravimi viimasest manustamisest on  
mõöduunud 60 tundi (st. 5. lüpsikorral).  
Siga: lihale ja soödavatele kudedele: 31 päeva.  
Pärast esmasti kasutada 28 päeva jooksul.  
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Zoetis Belgium

51754518

zoetis